

Роль социального работника в мульти дисциплинарном коллективе бариатрических центров (на примере медцентра Зив, Цфат)

The role of social worker at a multidisciplinary teamwork in the Bariatric Clinic Oriented to Ziv Medical Center




Шленская Лидия M.S.W.
социальный работник
зам. начальника соцотдела

Вчера рекорд – сегодня «норма»




**САМЫЙ ТОЛСТЫЙ
ЧЕЛОВЕК В МИРЕ
1903 ГОД**



**АМЕРИКАНСКИЙ
ОФИЦЕР ПОЛИЦИИ
2012 ГОД**

pikabu.ru



$$\text{BMI} = \frac{\text{weight in kg (в\text{е}с в кг)}}{(\text{height in meters})^2 (\text{рост в м}^2)}$$

Degrees of Obesity –Body Mass Index

NORMAL
18.5 – 24.9



OVERWGT
25 – 29.9



OBESE
30 – 34.9



SEVERELY OBESE
35 – 39.9



MORBIDLY OBESE
≥ 40



Мир становится более «тяжелым»

- В мире 1.6 миллиарда людей, страдающих от ожирения
- 700 миллионов – с патологическим опасным для жизни ожирением
- В России 24 % страдают ожирением, 11.200.000 нуждаются в бариатрических операциях
- В Израиле 62 % страдают от чрезмерной полноты и 13 % от патологического ожирения

Патологическое ожирение влияет

- На состояние здоровья
- Значительно сокращает продолжительность жизни
- Мешает качеству жизни
- У "тяжелых людей" больше психопатологий

Патологическое ожирение – не только медицинская, но и социальная проблема

Способы решения проблемы


- Традиционные методы психологии и психиатрии
- Правильное питание и занятия спортом

Результат – вес возвращается в течение первых трех лет



Бариатрическая операция

- Только при патологическом опасном ожирении
- Продлевает длительность жизни
- Устраняет сопутствующие болезни



Ожирение - только ли медицинская
проблема???????



Немного статистики по Израилю

- Количество операций в год – 13. 980
- Количество операций в медцентре Зив - 1024 (с 2009 года)
- Издание распоряжения Минздрава о бариатрических центрах - 2014 год

***Обязательное условие –
мульти дисциплинарный коллектив***



Стадии лечения бариатрического пациента

- Предоперационная стадия
- Послеоперационная стадия
- Длительное послеоперационное сопровождение больного



Регулировка бариатрического движения



- Человек с психиатрическими проблемами без поддержки окружения
- Проблематичность соблюдения предписаний
- Небольшая психопатология, поддающаяся лечению
- Возможна проблематичность в исполнении предписаний
- Человек, обладающий устойчивой психикой и мотивацией
- Поддержка окружения

Роль соцработника в послеоперационном периоде

В хирургическом отделении

- Индивидуальная моральная поддержка
- Проведение групповой встречи в отделении

В условиях поликлиники при больнице

- "Драматическое" снижение веса и улучшение здоровья
- Повышение настроения и самооценки

*Самый оптимальный период для
изменения образа жизни*



Когда заканчивается
сопровождение



Значение групп поддержки

Цель: Помощь в процессе выработки и закрепления новых привычек

- Количество участников 10 - 15
- Количество встреч - 10 встреч
- Продолжительность встречи – 1.5 часа
- Совместное ведение социального работника и диетолога



Спасибо за внимание



День здоровья в больнице Зив. 7 апреля 2016 г.